



Exercice 1

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

$$e^{3-x} = 1 ; e^{2x^2+3} = e^{7x} ; 2e^{-x} = \frac{1}{e^x+2} ; e^{x^3} = e^8 ; e^{x+1} = e^{\frac{1}{x}} ; e^{x^2} = (e^2)^3 e^{-x} ; e^{x^2} = e^{x-2}$$

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 ; 4e^{2x} - 4e + 1 = 0 ; e^{2x} - e^x + 2 = 0$$

Exercice 2

Résoudre dans \mathbb{R} les inéquations suivantes :

$$e^{x^2} \leq \frac{1}{e^2} ; (e^x)^3 \leq e^{x+6} ; e^x \leq \frac{1}{e^x} ; (e^x - 1)e^x > e^x - 1 ; e^{2x} < e^x ; 3e^{2x} + e^x - 4 < 0$$

Exercice 3

Déterminer les dérivés des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x^2 - 2x)e^x ; g(x) = \frac{e^x}{x+1} ; h(x) = \frac{e^x - 1}{2e^x + 1} ;$$

$$u(x) = \frac{e^x}{e^x - x} ; v(x) = x^2 - 2(x-1)e^x ; w(x) = xe^{2x-3}$$

Exercice 4

Déterminer le domaine D_f de définition de la fonction f , dans les cas suivants, et calculer ses limites aux bornes de D_f :

$$a) f(x) = \frac{e^x - 1}{2x} \quad b) f(x) = 2xe^{-x} \quad c) f(x) = \frac{e^x - 1}{2e^x + 1} \quad d) f(x) = x + 2 + xe^x$$

Exercice 5

1/ Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation: $t^2 + t - 6 < 0$

2/ Résoudre dans \mathbb{R} , l'équation $(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$ et l'inéquation : $(\ln x)^2 + \ln x - 6 > 0$

3/ Résoudre dans \mathbb{R} , les inéquation : $e^{2x} + e^x - 6 \leq 0$ et $e^{x+1} + e^{\frac{x+1}{2}} - 6 > 0$.

Exercice 6

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = (xe^x - 1)e^x$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 2cm)

1/ Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation graphique à ce résultat.

2/ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement ces résultats

3/ a/ Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = e^x (e^x - 1 + 2xe^x)$

b/ Vérifier que $f'(0) = 0$ et donner une interprétation graphique de ce résultat

c/ Montrer que : $\forall x \in [0; +\infty[; e^x - 1 \geq 0$ et $\forall x \in]-\infty; 0]; e^x - 1 \leq 0$

d/ Dresser le tableau de variation de f sur \mathbb{R}

4/ Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans \mathbb{R} et que $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.

5/ Construire la courbe (C_f) . On admettra que la courbe a un point d'inflexion dont le calcul n'est pas demandé.

Exercice 7

Calculer les limites suivantes :



$$* \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{\frac{\ln x}{x}}$$

$$* \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{1 - \sqrt{1+x}}$$

$$* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \ln x}{e^x + \ln x}$$

Exercice 8

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$

On note par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité graphique 2cm.

1/ a/ Justifier que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

b/ Donner une interprétation graphique de ce résultat.

2/ a/ Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

b/ Donner une interprétation graphique de ces résultats.

3/ a/ Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}); f'(x) = (x^2 - 2x - 1)e^{-x}$

b/ Justifier que :

$$* \forall x \in]-\infty; 1 - \sqrt{2}[\cup]1 + \sqrt{2}; +\infty[, f'(x) > 0$$

$$* \forall x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[, f'(x) < 0$$

c/ Dresser le tableau de variation de la fonction f

4/ Montrer que l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse 0, est : $y = -x + 1$

5/ Construire la courbe (C_f) et la tangente (T) . On prendra $f(1 - \sqrt{2}) \approx 1,3$ et $f(1 + \sqrt{2}) \approx -0,4$.