

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة الاستدراكية 2023 -الموضوع-	+0X1184+11C4040 +0C0L00+180XC400E80 A 8001C8 0CJL008 A +81184  المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والابتداء المركز الوطني للتقويم والامتحانات
1/6		

3 ساعات	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	العلوم التجريبية بمسلكها – خيار فرنسية-	الشعبة أو المسلك

INSTRUCTIOS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter

COMPOSANTES DU DUJET

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants
entre eux et répartis suivants les domaines comme suit :

Exercice 1	Suites numériques	3 points
Exercice 2	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 3	Nombres complexes	3 points
Exercice 4	Calcul des probabilités	3 points
Problème	Etude des fonctions numériques Et calcul intégral	8 points

- On désigne par \bar{z} le conjugué du nombre z complexe et par $|z|$ son module
- Ln désigne la fonction logarithme népérien

Exercice 1 :(3 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et } u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}, \text{ pour tout entier naturel } n$$

- 0,5 1) Montrer que pour tout entier naturel $n : u_n > -1$
- 0,5 2) Montrer que la suite (u_n) est décroissante, puis déduire que (u_n) est Convergente
- 3) On pose : $v_n = \frac{3}{1+u_n}$, pour tout entier naturel n
- 0,5 a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 puis déterminer son premier terme
- 0,5 b) Exprimer u_n en fonction de n , pour tout n de \mathbb{N} et déduire la limite de la suite (u_n)
- 4) On pose $w_n = e^{3-v_n}$ et $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$, pour tout n de \mathbb{N}
- 0,5 a) Montrer que (w_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme
- 0,5 b) Calculer la limite de la somme S_n

Exercice 2 :(3 points)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(2,1,2); B(-2,0,5); C(4,-5,7)$ et $\Omega(1,-1,0)$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$

- 0,5 1) a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 13\vec{u}$ et en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés
- 0,25 b) Vérifier que $x + 2y + z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
- 0, c) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A

2) Soient (P) le plan d'équation cartésienne $3x + 4y + z + 1 = 0$ et (Δ) la Droite passant par le point A et orthogonale au plan (P)

0,5

a) Montrer que la droite (Δ) coupe le plan (P) au point $H\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$

0,5

b) Déterminer les coordonnées du point D tel que H soit milieu du segment $[AD]$

3) Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$

0,25

a) Montrer que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D

0,5

b) Montrer que les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC)

Exercice 3 :(3 points)

1) On considère le nombre complexe $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

0,25

a) Montrer que : $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

0,25

b) Dédurre que a^{2022} est un nombre réel

0,5

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives a et \bar{a} déterminer une mesure de l'angle de la rotation R de centre O et qui transforme B en A

3) On considère dans l'ensemble \mathbb{C} , l'équation $(E_a): z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ où α est un nombre réel non nul.

On suppose que l'équation (E_a) admet deux racines complexes Conjuguées non réelles z et \bar{z} .

Soient les points $M(z); N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe.

Sans résoudre l'équation (E_a) :

0,5

a) Justifier que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$

0,5

b) Montrer que $|z| = |z - \sqrt{3}|$

0,5

c) En déduire que les points M et N appartiennent à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

0,5

d) Déterminer la valeur de α pour laquelle $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduire dans ce cas , les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Exercice 4 :(3 points)

Une urne contient quatre boules blanches et deux boules noires, indiscernables au toucher.

1) On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

0,5

a) Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer au moins une boule noire »

0,5

b) Soit l'événement B : « obtenir deux boules de même couleur ». Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$

0,5

c) On répète cette expérience cinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage.

Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé exactement Trois fois

2) Dans cette question, on tire des boules de l'urne, une après l'autre et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule blanche pour la première fois.

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués Dans cette expérience.

0,25

a) Justifier que les valeurs prises par X sont : 1 ; 2 ; et 3

0,25

b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$

0,5

c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X

0,5

d) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire ?

Problème :(8 points)

On considère la fonction numérique f définie sur \mathbb{R} par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)} & ; x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) & ; x > 2 \end{cases}$$

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(unité : 1 cm)

- 0,5 1) Montrer que la fonction f est continue au point 2
- 0,25 2) a) Vérifier que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$, $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$
- 0,5 b) Montrer que f est dérivable à gauche en 2
- 0,75 c) Montrer que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter géométriquement le résultat
- 0,25 3) a) Vérifier que pour tout $x \leq 2$, $f(x) = x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$
- 0,5 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter géométriquement le résultat
- 0,75 c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat
- 0,5 4) a) Montrer que pour tout $x < 2$, $f'(x) = 2x(x-1)(2-x)e^{x(2-x)}$
- 0,5 b) Montrer que pour tout $x > 2$, $f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$
- 0,5 c) Résoudre dans l'intervalle $]2, +\infty[$, l'inéquation : $1 + 2\ln(x-2) \leq 0$
- 0,75 d) Etudier le signe de $f'(x)$ sur \mathbb{R} puis dresser le tableau de variations de f sur \mathbb{R}
- 1 5) Construire la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- (On donne : $f(3) = 1$; $2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 2,6$ et $f\left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}}\right) = 0,8$)
- 6) Soit $\lambda \in]2, 3[$
- 0,5 a) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

6/6

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – الدورة الاستدراكية 2023 -الموضوع
مادة: الرياضيات – شعبة العلوم التجريبية بمسلكها – خيار فرنسية

RS 22F

$$\int_{\lambda}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) dx = -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\lambda-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2) \right)$$

0,5

b) Déduire en fonction de λ , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C) et les droites d'équations : $y=1$, $x=\lambda$ et $x=3$

0,25

c) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow 2^+} A(\lambda)$

FIN

[HTTPS://WWW.DIMAMATH.COM](https://www.dimamath.com)
Smail Eljaâfari